

	<b>Isolationsdauer</b> für Infizierte (Für den Beginn ist der Tag der PCR-Testung maßgeblich)	<b>Quarantänedauer</b> für enge Kontaktpersonen (Für den Beginn ist der Zeitpunkt des letzten Kontakts zu einem bestätigten Fall maßgeblich)	Folgende enge Kontaktpersonen müssen NICHT in Quarantäne
<b>ohne vorherige Testung</b>	<b>10 Tage</b>	<b>10 Tage</b>	<b>Personen mit einer Auffrischimpfung</b> (Boosterimpfung), insgesamt sind drei Impfungen erforderlich (auch bei jeglicher Kombination mit COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)),
<b>Allgemeine Bevölkerung</b> (inklusive Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe)	Wenn sie zuvor 48 Stunden symptomfrei sind, bei einem am <b>7. Tag</b> abgenommenen negativen PCR-Test oder zertifizierten Antigen-Schnelltest <sup>1,2</sup> .	Endet für Personen ohne Krankheitszeichen, bei einem am <b>7. Tag</b> abgenommenen negativen PCR-Test oder zertifizierten Antigen-Schnelltest.	<b>Geimpfte Genesene</b> (Geimpfte mit einer Durchbruchinfektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben),
<b>Schülerinnen und Schüler sowie Kinder in Kindertagesstätten</b>	Wenn sie zuvor 48 Stunden symptomfrei sind, bei einem am <b>7. Tag</b> abgenommenen negativen PCR-Test oder zertifizierten Antigen-Schnelltest <sup>1,2</sup> .	Endet ohne Krankheitszeichen bei einem am <b>5. Tag</b> abgenommenen negativen PCR-Test oder zertifizierten Antigen-Schnelltest, sofern regelmäßige Testungen in der Einrichtung erfolgen.	<b>Personen mit einer zweimaligen Impfung</b> , ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung, gilt auch für COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson),  Personen mit einem spezifischen <b>positiven Antikörpertest</b> und einer nachfolgenden Impfung, ab der Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung– eine Zuerkennung des Genesenen-Status ist mit dem Antikörpernachweis jedoch nicht verbunden,  <b>Genesene</b> ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests.

<sup>1</sup> Ein am 7. Tag abgenommenen negativen PCR-Test wird für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe empfohlen.

<sup>2</sup> Zur Beendigung der Isolation ist auch ein positiver PCR-Test mit einem CT-Wert < 30 zulässig.